

ENFERMERIA MED - IV

APP FREE

autores

- Nieves
- Pablo



EN QUE CONSISTE ...

- APP para Android, se va a implementar a IOS
- Temática Enfermera
- Sistema de Consulta
- Rápido y Eficaz

FICHA GOOGLE PLAY



Buscar

+Pablo

Aplicaciones

Mis aplicaciones

Tienda

Juegos

Selección de los editores

Categorías

Inicio

Top éxitos

Novedades



Enfermería Med - IV

Pablo Robledo Casado · 13 de abril de 2014

Medicina

Instalada

Esta aplicación es compatible con todos tus dispositivos.

★★★★★ (330)

8-1

+155



Enfermería

Presentación

Vál de 16 mg por 2 ml.

Indicación

Indicada para la prevención de vómitos y náuseas postoperatorias, anestesia general, cirugía o procedimientos, ...

Administración

IV DIFUSO: La dosis debe ser administrada en 10-15 ml, en 30-60 minutos. Debe existir un intervalo mínimo de 6 horas entre 2 administraciones.

IV INTERMITENTE: Administrar en 50-100 ml, en SF 0.9% o Ringier lactato.

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con antecedentes de reacción alérgica a los componentes de la solución.

Precaución

Monitorizar con atención a los pacientes que presenten reacciones alérgicas como: Dica Baxista, ...

Advertencia

Advertencia de medicamentos.



Enfermería

Presentación

Vál de 16 mg por 2 ml.

Indicación

Indicada para la prevención de vómitos y náuseas postoperatorias, anestesia general, cirugía o procedimientos, ...

Administración

IV DIFUSO: La dosis debe ser administrada en 10-15 ml, en 30-60 minutos. Debe existir un intervalo mínimo de 6 horas entre 2 administraciones.

IV INTERMITENTE: Administrar en 50-100 ml, en SF 0.9% o Ringier lactato.

Contraindicaciones


Contraindicado en pacientes con antecedentes de reacción alérgica a los componentes de la solución.

Precaución

Monitorizar con atención a los pacientes que presenten reacciones alérgicas como: Dica Baxista, ...

Advertencia

Advertencia de medicamentos.



Enfermería

Presentación

Vál de 16 mg por 2 ml.

Indicación

Indicada para la prevención de vómitos y náuseas postoperatorias, anestesia general, cirugía o procedimientos, ...

Administración

IV DIFUSO: La dosis debe ser administrada en 10-15 ml, en 30-60 minutos. Debe existir un intervalo mínimo de 6 horas entre 2 administraciones.

IV INTERMITENTE: Administrar en 50-100 ml, en SF 0.9% o Ringier lactato.

Contraindicaciones


Contraindicado en pacientes con antecedentes de reacción alérgica a los componentes de la solución.

Precaución

Monitorizar con atención a los pacientes que presenten reacciones alérgicas como: Dica Baxista, ...

Advertencia

Advertencia de medicamentos.



Enfermería

Presentación

Vál de 16 mg por 2 ml.

Indicación

Indicada para la prevención de vómitos y náuseas postoperatorias, anestesia general, cirugía o procedimientos, ...

Administración

IV DIFUSO: La dosis debe ser administrada en 10-15 ml, en 30-60 minutos. Debe existir un intervalo mínimo de 6 horas entre 2 administraciones.

IV INTERMITENTE: Administrar en 50-100 ml, en SF 0.9% o Ringier lactato.

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con antecedentes de reacción alérgica a los componentes de la solución.

Precaución

Monitorizar con atención a los pacientes que presenten reacciones alérgicas como: Dica Baxista, ...

Advertencia

Advertencia de medicamentos.



Enfermería

Presentación

Vál de 16 mg por 2 ml.

Indicación

Indicada para la prevención de vómitos y náuseas postoperatorias, anestesia general, cirugía o procedimientos, ...

Administración

IV DIFUSO: La dosis debe ser administrada en 10-15 ml, en 30-60 minutos. Debe existir un intervalo mínimo de 6 horas entre 2 administraciones.

IV INTERMITENTE: Administrar en 50-100 ml, en SF 0.9% o Ringier lactato.

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con antecedentes de reacción alérgica a los componentes de la solución.

Precaución

Monitorizar con atención a los pacientes que presenten reacciones alérgicas como: Dica Baxista, ...

Advertencia

Advertencia de medicamentos.

QUE CONTIENE ...

- Ficha de Medicamentos Frecuentes
- Calculadoras
- Técnicas de Enfermería

¿POR QUÉ?

- Observación
- Consulta a Enfermeras
- Consulta a Estudiantes
- Análisis de Resultados

MEDICAMENTOS

- FICHA
- Presentación
- Indicación
- Administración
- Suero Compatible
- Precaución



MEDICAMENTOS

Medicacion

NOMBRES COMERCIALES
A
Acetilcisteína
Actocortina
Adrenalina
Amoxicilina + Clavulánico
Atropina
B
Butilescopolamina
C

MNombres_Comerciales
NOMBRES COMERCIALES
ACOLONTA - Tramadol
ANEXATE - Flumazenilo
BAYCIP- Ciprofloxacino
BLSCAPINA - Eutilescolamina
ELGADIL - Urapidil
ENANTYUM - Desketoprofeno
EUFILINA - Teofilina
FLUMIL - Acetilcisteína
FORTECORTIN - Dexametasona
KONAKION - Vitamina K

FICHA MEDICAMENTOS

3G 10:40

MOmeprazol




PRESENTACIÓN
Vial de 40 mg.

INDICACIÓN
Indicado para el tratamiento de: úlceras duodenales y sus recidivas, úlceras gástricas, en combinación con antibióticos para *Helicobacter pylori*, úlceras asociadas a AINES, ...

ADMINISTRACIÓN
PERFUSIÓN IV: Se debe disolver cada vial en 5 mL y diluirse inmediatamente después hasta 100 mL con SF o SG5%. Se administrará durante 20-30 min.
IMPORTANTE: Sólo disolver con 5 mL y diluir en 100mL.

SUEROS COMPATIBLES



10:55

MOmeprazol

AINES, ...

ADMINISTRACIÓN
PERFUSIÓN IV: Se debe disolver cada vial en 5 mL y diluirse inmediatamente después hasta 100 mL con SF o SG5%. Se administrará durante 20-30 min.
IMPORTANTE: Sólo disolver con 5 mL y diluir en 100mL.

SUEROS COMPATIBLES
SF y SG5%.

ESTABILIDAD
Reconstituido: A Tª ambiente si se reconstituye con SF 12 h, con SG5% 6 h.

Diluido: Debe utilizarse inmediatamente, a menos que se haya reconstituido en condiciones asépticas controladas y validadas.

PRECAUCIÓN
No debe mezclarse con otros fármacos.
IMPORTANTE: Disolver con 5 mL y diluir en 100 mL.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Omeprazol GES 40 mg polvo para solución para perfusión EFO

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada vial contiene 40 mg de omeprazol (sódico). Después de la reconstitución, 1 ml contiene 0,4 mg de omeprazol.

Excipientes:

Cada vial contiene 3,2 mg de sodio.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvos para solución para perfusión (polvos para perfusión)

Polvos liofilizados blancos.

Intervalo de pH en glucosa y en cloruro de sodio 0,9%, es aproximadamente 9,3-10,0.

4. DATOS CLÍNICOS


4.1 Indicaciones terapéuticas

Omeprazol GES para uso por vía intravenosa está indicado como alternativa al tratamiento por vía oral para las siguientes indicaciones:

Adultos

- Tratamiento de úlceras duodenales
- Prevención de la recidiva de úlceras duodenales
- Tratamiento de úlceras gástricas
- Prevención de la recidiva de úlceras gástricas
- En combinación con antibióticos apropiados, erradicación de *Helicobacter pylori* (*H. Pylori*) en úlceras pépticas
- Tratamiento de úlceras gástricas y duodenales asociadas a los AINEs
- Prevención de úlceras gástricas y duodenales asociadas a los AINEs en pacientes de riesgo
- Tratamiento de la esofagitis por reflujo
- Control a largo plazo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico curada
- Tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática
- Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison

FICHA TÉCNICA



6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

El contenido íntegro de cada vial se debe disolver en aproximadamente 5 ml y diluirse inmediatamente después hasta 100 ml. Hay que utilizar solución para infusión de 9 mg/ml de cloruro de sodio (0,9%) o solución para perfusión de 50 mg/ml de glucosa (5%). El pH de la solución para perfusión afecta a la estabilidad del omeprazol, que por esta razón no se debe diluir en otros disolventes ni en otras cantidades.

Preparación

1. Extraer con una jeringa 5 ml de solución para perfusión del frasco o la bolsa de perfusión de 100 ml.

MINISTERIO DE
SALUD, POLÍTICA
SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios




2. Añadir este volumen al vial que contiene el omeprazol liofilizado y mezclar bien hasta tener la seguridad de que se ha disuelto todo el omeprazol.
3. Extraer de nuevo con la jeringa la solución de omeprazol.
4. Transferir la solución a la bolsa o al frasco de perfusión.
5. Repetir los pasos 1-4 hasta tener la seguridad de que se ha transferido todo el omeprazol desde el vial a la bolsa o el frasco de perfusión.

Método alternativo de preparación de perfusiones en envases flexibles

1. Utilizar una aguja de transferencia doble y conectarla a la membrana de inyección de la bolsa de perfusión. Conectar la otra punta de la aguja con el vial que contiene el omeprazol liofilizado.
2. Disolver el omeprazol bombeando solución para perfusión entre la bolsa de perfusión y el vial y viceversa.
3. Comprobar que se ha disuelto todo el omeprazol.

No se debe utilizar si se observan partículas en la solución reconstituida.

ficha medicamentos



PRESENTACIÓN

Vial de 10 mg en 2 mL.

INDICACIÓN

Indicado para la prevención de vomitos y nauseas postoperatorios, inducidos por migraña o por radioterapia,

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTA: La dosis debe ser administrada en Bolo Lento, en al menos 3 minutos. Debe existir un intervalo mínimo de 6 horas entre 2 administraciones.

IV INTERMITENTE: Administrar en 50-100 mL de SF, SG5% o Ringer-lactato.

SUEROS COMPATIBLES

SF, SG5%, RINGER.

Metoclopramida

Indicado para la prevención de vomitos y nauseas postoperatorios, inducidos por migraña o por radioterapia,

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTA: La dosis debe ser administrada en Bolo Lento, en al menos 3 minutos. Debe existir un intervalo mínimo de 6 horas entre 2 administraciones.

IV INTERMITENTE: Administrar en 50-100 mL de SF, SG5% o Ringer-lactato.

SUEROS COMPATIBLES

SF, SG5%, RINGER.

ESTABILIDAD

Una vez preparada la solución para perfusión, se tendrá que administrar inmediatamente.


PRECAUCIÓN

No mezclar con soluciones que presenten reacción alcalina como: bicarbonato sódico, gluconato cálcico, cefalotinas o cefalosporinas, diamorfina, furosemida, ...

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS

FICHA TÉCNICA

RESTRICCIONES



RESTRICCIONES



AGENCIA ESPAÑOLA DE
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS

Bienvenidos | Benvinguts | Ongi etorri | Benvidos | Welcome | Benvinguts

Buscar

Síguenos:   

La AEMPS | Medicamentos de uso humano | Medicamentos veterinarios | Productos sanitarios | Cosméticos e higiene | Industria

Portada la AEMPS informa

Última información

> Notas informativas

Notas de seguridad

Alertas

Boletín mensual de la AEMPS

Área de prensa

Circulares

Área de proyectos en tramitación

Listas correo electrónico

Canales RSS

Información y atención al ciudadano

Campañas

Inicio > La AEMPS informa > Notas informativas > Medicamentos de uso humano > Seguridad

> Metoclopramida: restricciones de uso, actualización de indicaciones y posología

Última actualización: 30/07/2013

[Puede consultar esta nota en formato pdf !\[\]\(6a9335257ee4bae53722233b4f4983f7_img.jpg\)](#)

METOCLOPRAMIDA: RESTRICCIONES DE USO, ACTUALIZACIÓN DE INDICACIONES Y POSOLOGÍA

Fecha de publicación: 30 de julio de 2013

Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, SEGURIDAD.
Referencia: NUIH (PV), 22/2013

Finalizada la revisión del balance beneficio-riesgo de metoclopramida en sus indicaciones autorizadas, se recomienda:

- No utilizar metoclopramida en niños menores de 1 año.
- Restringir su uso en niños y adolescentes de 1 a 18 años como segunda línea de tratamiento en prevención de náuseas y vómitos retardados en quimioterapia y en tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorios.
- Restringir su uso en pacientes adultos para prevención y tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia (retardados), radioterapia, cirugía y migraña.
- Limitar la duración del tratamiento a un máximo de 5 días.
- Limitar la dosis máxima a 0,5 mg por kg de peso en 24 horas.

Se recomienda asimismo revisar el tratamiento de los pacientes que utilizan metoclopramida de forma habitual.

FICHA MEDICAMENTOS

MOndansetron



PRESENTACIÓN

Vial de 8 mg / 4 mL.

INDICACIÓN

Indicado para el control de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia citotóxicas y postoperatorios.

ADMINISTRACIÓN

IV EN BOLO: Administración IV lenta para dosis inferiores a 8 mg.

PERFUSIÓN IV: Para dosis mayores de 8 mg, deberá diluirse en 50-100 mL de SF u otros compatibles y administrar en no menos de 15 min. No se debe administrar una dosis mayor de 16 mg.

SUEROS COMPATIBLES

MOndansetron

IV EN BOLO: Administración IV lenta para dosis inferiores a 8 mg.

PERFUSIÓN IV: Para dosis mayores de 8 mg, deberá diluirse en 50-100 mL de SF u otros compatibles y administrar en no menos de 15 min. No se debe administrar una dosis mayor de 16 mg.

SUEROS COMPATIBLES

SF, SG5%, MANITOL, RINGER.

ESTABILIDAD

Diluido: Puede almacenarse a 2-8°C durante 24 h.

PRECAUCIÓN


No debe ser mezclado con otros fármacos, excepto con los siguientes en Y: Cisplatino, 5-Fluorouracilo, Carboplatino, Ceftazidima, Etopósido, Ciclofosfamida, Doxorrubicina y Dexametasona.

Puede reducir el efecto analgésico del Tramadol.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS

FICHA TÉCNICA

CALCULADORAS



CALCULADORAS

SCalculadora

☒ Resultado en GOTAS

☐ Resultado en mL

INTRODUZCA DATOS

Volumen en mL:

Tiempo en Minutos:

RESULTADO:

Gotas por Minuto

mL por Minuto

Recordemos:
Gotas: 1 mL = 1 cc = 20 gotas

CIMC

INDICE DE MASA CORPORAL

Peso ... Kg

Altura ... cm

Su indice de masa corporal es

18,5 - 24,9 ... Normopeso


25 - 29,9 ... Sobrepeso

30 - 34,9 ... Obesidad Clase I

35 - 39,9 ... Obesidad Clase II

≥ 40 ... Obesidad Clase III

TÉCNICAS



BASADO EN EVIDENCIA

TIClexane



HEPARINA SbC

1. Limpiar siempre la zona con alcohol. No Frotar.
2. Dejar la burbuja de aire arriba. *
3. Coger pliegue en gente delgada. No coger pliegue en obesos. ** (UNO)
4. Pinchar SbC normalmente en 90°. A gente muy delgada inyectar a 45°. ** (DOS)
5. Inyectar durante 30 seg., o durante 10 seg. y retirar la aguja a los 10 seg. (20 seg.). ** (TRES y CUATRO).

* Ayuda a inyectar la totalidad del fármaco (incluida aguja) y como sello de aire.

TIClexane

3. Coger pliegue en gente delgada. No coger pliegue en obesos. ** (UNO)
4. Pinchar SbC normalmente en 90°. A gente muy delgada inyectar a 45°. ** (DOS)
5. Inyectar durante 30 seg., o durante 10 seg. y retirar la aguja a los 10 seg. (20 seg.). ** (TRES y CUATRO).

* Ayuda a inyectar la totalidad del fármaco (incluida aguja) y como sello de aire.

** Reduce el hematoma y el dolor.

BIBLIOGRAFÍA:

UNO

DOS

TRES

CUATRO

1. Aguilera Manrique C et al. Administración de heparinas de bajo peso molecular y aparición de hematoma. Enfermería Clínica. Vol 12. Num 03. Mayo 2002.
2. Rushing J. Administering an enoxaparin injection. Clinical Diabetes & Nutrition. March 2008.
3. Zaybak A, Khorshid L. A study on the effect of the duration of subcutaneous heparin injection on bruising and pain. Journal of clinical Nursing. Vol 17, Issue 3. pages 378-385. February 2008.
4. Baldi R, Celebioglu A. Effect of injection duration on bruising associated with subcutaneous heparin: A quasi-experimental within-subject design. International Journal of Nursing Studies. Vol 45, Issue 5, Pages 812-817. June 2008

VACUNACIÓN

TVacunacion

VACUNACIÓN

Lugar anatómico y Aguja

Vía de Administración

Termo-estabilidad

Excipiente - Alergia

CALENDARIO

Calendario Vacunal

TVCalendario

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Calendario de Vacunaciones Infantiles
EN CASTILLA-LA MANCHA

The calendar displays the following vaccination schedules:

- Recién Nacido:** Hepatitis B
- 2 meses:** Poliovirus, Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria, Hepatitis A
- 4 meses:** Poliovirus, Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria, Hepatitis A
- 6 meses:** Poliovirus, Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria, Hepatitis A
- 12 meses:** Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria, Hepatitis A
- 18 meses:** Poliovirus, Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria, Hepatitis A
- 4 años:** Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria
- 6 años:** Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria
- 12 años:** Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria
- 14 años:** Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria
- 14 años:** Sarampión, Escarlatina, Tétanos, Difteria

* Contempla refuerzo a niños que a los 12 años no hayan pasado la enfermedad por no haber recibido una dosis previa.
** No se recomienda y puede haber efectos adversos de la vacuna en niños.

APP SALUDABLE

**Estrategia de calidad y seguridad
en aplicaciones móviles de salud**

**Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía**
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

[Inicio](#) [Recomendaciones](#) [Distintivo AppSaludable](#) [Recursos](#) [Noticias](#) [Sobre el proyecto](#)

**Distintivo
AppSaludable**



**Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía**
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

*Reconocimiento de aplicaciones de salud para su uso de forma fiable,
minimizando riesgos.*

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha elaborado una serie de recomendaciones que pretenden fomentar el buen uso y desarrollo de las aplicaciones móviles de salud. Estas recomendaciones están dirigidas a todos los colectivos: desarrolladores, profesionales sanitarios y ciudadanía. [\[Más información\]](#)

 **Diseño
y pertinencia**

 **Calidad y seguridad
de la información**

 **Prestación
de servicios**

 **Confidencialidad
y privacidad**

Noticias

¿A qué deben prestar atención las aplicaciones móviles de salud?
11 ago 2014

Nuevas aplicaciones móviles de salud obtienen el Distintivo AppSaludable
25 jul 2014

Green Paper de mSalud, un impulso de la Comisión Europea para implementar soluciones móviles de salud

Tweets [Seguir](#)

**Actualidad Informática**
Actualidad Informática Actualidad Informática
Proyecto AppSaludable: la prescripción de aplicaciones
bit.ly/1xWY7uH @CalidadAppSalud #informacia
#appsalud
13 Retweets por CalidadAppSalud
Abr 16

**CalidadAppSalud** @CalidadAppSalud
Actualización de la información de los usuarios de la AppSaludable

APP SALUDABLE

¿Qué es el Distintivo AppSaludable?

El **Distintivo AppSaludable** es el primer distintivo en español que reconoce la calidad y seguridad de las apps de salud. Es un distintivo **gratuito** y **abierto a todas las aplicaciones** de iniciativas públicas y privadas, tanto españolas como de cualquier otro país.


Aquellas apps de salud que superen el proceso de validación, llevado a cabo desde la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, obtendrán el **Distintivo AppSaludable** que estará en vigor mientras la app esté activa o hasta que se produzcan cambios en sus contenidos y/o funcionalidades (los responsables adquirirán el compromiso con la Agencia de Calidad Sanitaria de hacer una revisión del proceso cuando la app tenga cambios significativos).

Este distintivo se basa en las 31 recomendaciones ya publicadas en la [Guía de recomendaciones para el diseño, uso y evaluación de apps de salud](#), que se estructuran en 4 bloques: Diseño y pertinencia; Calidad y seguridad de la información; Prestación de servicios y Confidencialidad y Privacidad.

Al final del proceso, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía concede el **Distintivo AppSaludable** con las instrucciones para poder instalarlo en la aplicación.

Las apps de salud con el **Distintivo AppSaludable** formarán parte de un directorio de apps destacadas por su calidad y seguridad.

Fases del proceso:



APP SALUDABLE

 Distintivo
AppSaludable

 Agenda de Calidad Sanitaria de Andalucía
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

Pablo Robledo Casado | Salir

Proyectos | Mantenimiento de colaboradores |

Proyecto 14-0028 EV
Infarmena Med IV

Ficha

Zona de comunicación

Autoevaluación

Diseño y pertinencia

Calidad y seguridad de la información

Prestación de servicios

Confidencialidad y privacidad

Recomendaciones

Seleccionar...

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD

Privacidad y protección de datos

Recomendación 21. Antes de su descarga e instalación, la app de salud informa sobre qué datos del usuario se recogen y para qué fin, sobre las políticas de acceso y tratamiento de datos y acerca de posibles acuerdos comerciales con terceros.

Recomendación 22. La app de salud describe de forma clara y comprensible los términos y condiciones sobre la información registrada de carácter personal.


Recomendación 23. El funcionamiento de la app de salud preserva la privacidad de la información registrada, recoge consentimientos expresados del usuario y advierte de los riesgos derivados del uso de aplicaciones móviles de salud en red.

Recomendación 24. Si la app de salud recoge o intercambia información de salud o cualquier otro dato especialmente sensible de sus usuarios, garantiza las medidas de seguridad correspondientes.

Recomendación 25. La app de salud informa a los usuarios cuando tiene acceso a otros recursos del dispositivo, cuentas del usuario o perfiles en redes sociales.


Recomendación 26. La app de salud garantiza en todo momento el derecho de acceso a la información y la actualización ante cambios de su política de privacidad.

DESCARGAS



DESCARGAS PAÍSES

INSTALACIONES TOTALES POR USUARIO DE PAÍS



INSTALACIONES TOTALES POR USUARIO EL 08/09/2014



	TU APLICACIÓN	
☒ México	9.930 29,08%	
☒ Brasil	8.407 18,76%	
☒ Chile	3.808 11,15%	
☐ España	3.268 9,57%	
☐ Colombia	1.869 5,47%	
☐ Argentina	1.734 5,08%	
☐ Estados Unidos	940 2,75%	
☐ Perú	707 2,07%	
☐ Venezuela	575 1,69%	
☐ Ecuador	415 1,22%	
☐ Otras	4.497 13,17%	

TODAS LAS APLICACIONES DE MEDICINA

2,24%
4,05%
0,63%
1,83%
0,60%
0,84%
13,15%
0,35%
0,34%
0,23%

TOP 10 PAÍSES PARA MEDICINA

Estados Unidos	13,15%
India	5,28%
Brasil	4,05%
Rusia	3,52%
Alemania	2,33%
Japón	2,56%
Corea del Sur	2,32%
México	2,24%
Italia	2,23%
España	1,33%

VALORACIONES

VALORACIONES Y OPINIONES



OPINIONES

Filtros ▾

Página 1 de 2



Ir a la página

Ir



Versión de la aplicación: 1.5
bird82_wet_a_jb5

Drosyneoryare Jimenez Romero el 07/09/2014 a las 05:15

Excelente! Muy completa, aunq hay algunas cuestiones a mejorar.. en cuestion a los medicamentos y dosis

[Responder a esta opinión](#)



Versión de la aplicación: 1.5
Moto G (falcon_umts)

mauricio roa el 01/09/2014 a las 22:28

Muy buena Me parece súper buena. Felicitaciones.

[Responder a esta opinión](#)



Versión de la aplicación: 1.5
Moto G (falcon_umts)

Michelle Romero el 01/09/2014 a las 15:21

Es muy útil Pero faltan muchos fármacos y algunos diagnósticos de Eu

[Responder a esta opinión](#)



Versión de la aplicación: 1.5
Xperia V (LT25i)

Cristina Reville Moro el 25/06/2014 a las 01:48

Buena guía recordatoria para tener a mano.....

[Responder a esta opinión](#)

MÉRITOS



Meet Our Blogger

Join Megan Duffy, site blogger, RN, BA, BSN, and CEN as she explores the world of nursing.

Megan Duffy, RN, BA, BSN, CEN, works in corrections in the Midwest after years of ER and ICU nursing. She has served as a local board member of the Kansas State Nurses Association and is a contributing editor to the American Journal of Nursing. She is also a freelance writer and medical editor.

Megan keeps our readers up-to-date and informed on the latest news and changes in the nursing profession as well as offers personal insight into what her life is like in the healthcare industry. Her blog is a down-to-earth and friendly place that dispenses advice and professional wisdom. She's an incredible resource, and we're lucky to have her!



Megan Duffy, RN

OnlineLPNtoRN.org

Our Guide to Terrific Apps Every Nurse Should Be Using

MÉRITOS



6 apps per a la Infermeria

14/07/2014 per moniserratfernandez barrea | Cap comentaris

En un mercat el qual hi ha milers d'aplicacions per a telèfons intel·ligents i tauletes, l'àmbit de la Infermeria també es troba representat. La creació d'apps per a infermers és una realitat i cada cop és més habitual trobar aquests professionals fent servir alguna d'aquestes aplicacions mentre fan la seva feina.

CERCA A L'ESCORXADOR

CERCAR

4. Enfermeria Med – IV



Descripció:

Amb l'aplicació Medicació IV els professionals podran fer diferents coses: indicació, sèrums compatibles, càlcul de perfusió, etc.

Tècniques d'infermeria basades en l'evidència amb bibliografia inclosa en línia. En castellà.

Edició: Pablo Robledo Casado

PROYECTO

- ACTUALIZAR LA APP
- MEJORAR LOS RECURSOS
- IOS (IPHONE)

MUCHAS GRACIAS